


Morosil®

Contribui para até 50% menos barriga e 100% mais felicidade!

A célula adipocitária armazena energia e acumula triacilglicerol durante excesso nutricional. É bem conhecido que a disfunção do metabolismo dos adipócitos desempenha um papel importante no desenvolvimento da obesidade e resistência à insulina. O adipócito sintetiza e segrega moléculas biologicamente ativas denominadas adipocitocinas - a adiponectina é uma das mais importantes, é específica e altamente expressa nos adipócitos. Ao contrário da maioria das proteínas secretadas pelo tecido adiposo, a adiponectina é secretada inversamente ao tamanho do adipócito, ou seja, ao conteúdo de lipídio nele presente.

Adipócitos com baixo conteúdo de lipídio secretam hormônios insulina-sensível como a adiponectina, leptina e outros peptídeos, já os adipócitos com alto conteúdo de lipídeo induzidos por dietas gordurosas causam diminuição da produção de hormônios insulina-sensíveis, resultando na resistência à insulina. Desta forma, as concentrações séricas de adiponectina são menores em indivíduos obesos, uma vez que se correlacionam negativamente com a porcentagem de gordura corpórea, além de fatores de risco cardiovascular, como pressão arterial, colesterol total, LDL-colesterol, triglicérides e ácido úrico.

É a ação antioxidante da antocianina que contribui para a regulação das disfunções dos adipócitos. Pensando em todos os seus benefícios, a Galena apresenta mais um importante aliado no gerenciamento do peso, o **Morosil®**. Um extrato seco obtido a partir do suco das Laranjas Vermelhas Moro - cultivadas no mediterrâneo, exclusivamente na área em torno do vulcão Etna, na Sicília (Itália) – que é a principal fonte dos pigmentos de antocianina em especial cyanidin-3-glucoside (C3G), um excelente antioxidante, que geralmente não são encontrados em outras frutas cítricas, além de conter elevada concentração de vitamina C, flavonóides e ácidos hidroxicinâmicos.



Abreviações: LXRα – liver X receptor; FAS – ácido graxo sintase; PPARα – receptor ativado por proliferador de peroxissoma-α ; PKA – proteína quinase A; HSL – hormônio lipase sensível; EO – estresse oxidativo; C3G – cianidina 3 glicosídica; VLDL – lipoproteína de densidade muito baixa (que carrega triglicérides do fígado para a circulação)

Nome Científico

Citrus aurantium dulcis (Citrus Sinensis (L) Osbeck)

Dose usual

400 mg a 500 mg ao dia

Atributos do produto

- Extrato do suco das laranjas vermelhas Moro, ativo natural, cultivadas em torno do vulcão Etna na Sicília, Itália.
- Potente sinergismo entre os componentes antocianinas, flavonoides, ácido ascórbico e ácidos hidroxicinâmicos na ação antioxidante.
- Contém a antocianina específica C3G, uma importante aliada na redução de medidas e no gerenciamento do peso.
- Além da ação no auxílio da redução de medidas possui excelente ação antioxidante.
- Estimula a síntese de adiponectina.
- Auxilia na modificação do metabolismo dos adipócitos.
- Favorece a redução da gordura abdominal de 25 a 50%.
- Contribui para a redução da Esteatose Hepática.
- Favorece o aumento da sensibilidade à insulina.
- Auxilia na redução significativa dos níveis de triglicérides e colesterol total.

Estudos comprovam que a Laranja Vermelha Moro proporciona ações exclusivas

• Contribui para uma redução acentuada no tamanho dos adipócitos pela diminuição do acúmulo de lipídeos e aumento da sensibilidade à insulina: Nos adipócitos, a antocianina específica C3G modula vários genes envolvidos no metabolismo de lipídios, incluindo Acil-CoA sintetase e lipase lipoprotéica (LPL), contribui também para o controle da expressão da proteína transportadora de ácidos graxos, ambos envolvidos na captação de lipídeos pelos adipócitos. E através da adiponectina, ocorre a redução dos níveis de triglicérides no músculo e fígado, reduzindo assim a resistência à insulina. Esse efeito é consequência do aumento de moléculas envolvidas tanto na metabolização de ácidos graxos, quanto na dissipação de energia muscular.

• O mecanismo sinérgico dos polifenóis totais do extrato da Laranja Vermelha Moro, auxilia no gerenciamento do peso e a redução dos triglicérides e do colesterol total pela diminuição da HMG-CoA redutase, enzima fundamental na síntese do colesterol, levando a uma redução do colesterol tecidual e um consequente aumento na expressão dos receptores de LDL.

Morosil® na Esteatose Hepática


Morosil® no fígado, contribui para diminuir a expressão de genes envolvidos com a síntese de triacilgliceróis, como LXR e FAZ, reduzindo de forma significativa a lipogênese, além de aumentar a oxidação de gorduras através do PPAR α .

Os estudos relacionados à laranja vermelha Moro são promissores no cuidado e prevenção da Esteatose Hepática. Devido à potente ação antioxidante e o sinergismo dos componentes únicos, **Morosil®** possui uma ampla gama de benefícios, proporcionando melhora significativa do acúmulo de gordura no fígado e redução nos níveis sanguíneos de triacilgliceróis.

EFICÁCIA DO MOROSIL®

Redução da gordura abdominal

Um estudo recente publicado na conceituada revista *International Journal of Obesity* mostrou que o extrato da Laranja Vermelha Moro - obtido do suco enriquecido - diminui o ganho de peso e o acúmulo de gordura induzida em animais alimentados com dieta hiperlipídica.



RESULTADO

O estudo comprovou que o extrato da laranja Moro auxilia na redução da gordura abdominal. O exame histológico do tecido adiposo demonstra também uma redução acentuada no tamanho dos adipócitos, devido à diminuição da capacidade de acumular gordura.

Sugestões de

Fórmulas

uso IN e OUT

Referências bibliográficas Literatura do fornecedor – Bionap (Itália) - 1. Titta L, et al., Blood Orange juice inhibits fat accumulation in mice. *Int J Obesity* 34(3):578-588 (2009). 2. Tsuda T, et al., Microarray profiling of gene expression in human adipocytes in response to anthocyanins. *Biochem Pharmacol* 71:1184-1197(2006). 3. Tsuda T., Regulation of adipocyte function by anthocyanins; possibility of Preventing the Metabolic Syndrome. *J Agric Food Chem* 56:642-646 (2008). 4. Tsuda T et al., Anthocyanin enhances adipocytokine secretion and adipocyte-specific gene expression in isolated rat adipocytes. *Biochem Biophys Res Commun* 316(1):149-157 (2004). 5. Guo H, et al., Cyanidin 3-glucoside protects 3T3-L1 adipocytes against H2O2 – or TNF- α -induced insulin resistance by inhibiting c-Jun NH2-terminal Kinase activation. *Biochem Pharmacol* 75:1393-1401 (2008).

IN

Auxílio na redução da medida abdominal, aumento da saciedade e controle glicêmico

Morosil®400 mg
Fibregum B™3g
Dissolver o conteúdo de um envelope em 1 copo de água e tomar imediatamente.

Associar com: Favorece a redução da retenção hídrica

Cacti-Nea™1 g
Tomar 1 dose pela manhã.

IN

Redução do excesso de gorduras

Morosil®200 mg
Neopuntia 500 mg
Administrar 1 dose, 2 vezes ao dia.

IN

Coadjuvante na melhora da esteatose hepática, resistência à insulina e dislipidemia

Morosil®200 mg
Vinoxin®50 mg
Ác alfa lipóico75 mg
Piridoxal 5 - fosfato3 mg
Vitamina B530 mg
Vitamina C60 mg
Administrar 1 dose, 1 a 2 vezes ao dia.

OUT

Ajuda na definição da silhueta, redução de medidas e tonicidade muscular

Actigym™5%
Remoduline®4%
Crema Xalifin 15® qsp60 g
Aplicar na região das coxas, abdômen e braço 2 vezes ao dia.

Magistral 0800 142 700 • 0800 701 4311 vendas@galena.com.br

Industrial 0800 144 150 industrial@galena.com.br

Desenvolvido por

BIONAP
Bioactive Natural Products

Prodotto
na Itália

Exclusividade

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica

#GALENA
#FUNCIONA